



ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

THE ROYAL THAI COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS

สำนักงานเลขาธิการ: ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทรศัพท์: ๐-๒๗๑๖-๕๗๒๑-๒๒, ๐-๒๗๑๖-๕๗๒๕ โทรสาร: ๐-๒๗๑๖-๕๗๒๐

Website: <http://www.rtcog.or.th> E-mail: pr_rtcog@rtcog.or.th and sc_rtcog@rtcog.or.th

มาตรฐานและจริยธรรมเพื่อสุขภาพของสตรี

ที่ปรึกษา

ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์

คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ

(วาระ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ประธาน

พล.อ.ท.นพ.การุณ เก่งสกุล

ผู้รับผิดชอบประธาน

ศ.คลินิก นพ.วิทยา ธิวาทินันท์

รองประธาน ๑

นพ.พิษณุ ชันติพงษ์

รองประธาน ๒

และประธานจริยธรรม

ผศ.นพ.ณัฐพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เลขาธิการ

ศ.นพ.อรอนพ ใจสำราญ

เหรียญก

รศ.พญ.พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ

กรรมการบริหาร

รศ.นพ.ศักดิ์ มะโนทัย

ประธานการฝึกอบรมและสอบฯ

นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล

ประธานแม่เร้ววิทยานรีเวช และ

ประธานการผ่าตัดผ่านกล้องฯ

ศ.นพ.กำธร พุกษานานนท์

ประธานเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์

ประธานเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ศ.พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล

ประธานการจัดประชุมวิชาการ

ศ.นพ.วรงค์ ภู่งศ์

ประธานการจัดทำวารสาร

รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์ศรีรัฐสาร

ประธานการวิจัย

นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์

ประธานการศึกษา

ศ.นพ.โกวิท คำพิทักษ์

ประธานการประชุมสัมมนาและสื่อสารองค์กร

รศ.พญ.จิตติมา สุนทรสัจ

ประธานมาตรฐานวิชาชีพ

รศ.นพ.พัญญ พันธ์บูรณะ

ประธานกิจการพิเศษ

ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่ ๑๖/๒๕๖๔

เรื่อง การรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในสตรีตั้งครรภ์

การวิเคราะห์ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ที่รวบรวมได้ในห้วงเวลา ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เกี่ยวกับโรคโควิด-๑๙ ในสตรีตั้งครรภ์ ได้พบข้อมูลสำคัญที่สมควรประกาศให้ประชาชนรับทราบ โดยเน้นวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์ทราบ และตระหนักถึงความจำเป็นในการป้องกันอันตรายจากโรคโควิด-๑๙ ทั้งต่อตนเองและลูกในท้อง ดังนี้

๑. สตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคโควิด-๑๙ มีอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ ๑.๘๕ สูงเป็น ๒.๕ เท่าของคนทั่วไป (ร้อยละ ๐.๘๓)

๒. ในจำนวนผู้เสียชีวิตนี้ ประมาณครึ่งหนึ่งยังไม่ได้คลอดบุตร

๓. การเสียชีวิตส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการหายใจล้มเหลว เนื่องจากสรีระของสตรีตั้งครรภ์ที่มดลูกโตขึ้น พร้อมกับมีน้ำคร่ำในมดลูกมากขึ้น (น้ำคร่ำมากที่สุดเมื่อท้อง ๘ เดือน หรือ ๓๒ สัปดาห์) จึงดันปอดให้ขยายตัวได้ลำบาก

๔. อัตราการตายของลูก มีประมาณร้อยละ ๑.๘ ซึ่งอาจตายก่อนคลอดหรือหลังคลอด

๕. อัตราการคลอดก่อนกำหนดมากกว่าปกติ

๖. อัตราการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก พบประมาณร้อยละ ๑๑.๘ ซึ่งอาจเกิดจากการถ่ายทอดโดยตรงหรือจากการสัมผัสหลังคลอด

ข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙

๑. วัคซีนทุกชนิดมีความปลอดภัยต่อทั้งแม่และลูก ในระดับที่นานาชาติรับรองในสถานการณ์พิเศษ

๒. วัคซีนในแม่ สามารถส่งต่อภูมิคุ้มกันโรคให้ลูกได้ด้วย

๓. ควรฉีดวัคซีนเข็มแรกหลังอายุครรภ์ ๓ เดือน (หรือ ๑๒ สัปดาห์) ทุกกลุ่มอายุของแม่

๔. วัคซีนทุกชนิดและทุกยี่ห้อ มีผลลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิต และสามารถฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนต่างชนิดต่างยี่ห้อได้ (Mix and Match)

๕. วัคซีนสามารถฉีดได้ในช่วงการให้น้ำนมบุตร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลอากาศโทนายแพทย์ 

(การุณ เก่งสกุล)

ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย